

Las lesiones por sobrecarga funcional del peroné y sus causas primarias.

Sonzini Brandán, Carlos Pablo (1996) *Las lesiones por sobrecarga funcional del peroné y sus causas primarias*. Universidad Católica de Córdoba. [Tesis Doctoral].

El texto completo no está disponible en este repositorio.

Resumen

Las lesiones óseas espontáneas, producidas por sobrecarga funcional, son conocidas en la literatura médica desde hace mucho tiempo con distintos sinónimos, tales como "fatiga", "stress", "solapada", etc. Estas lesiones son las que se presentan en un hueso sano, sin alteraciones anatómicas o metabólicas previas, y sin que medie una causa traumática evidente, pero sí, en cambio, una actividad física sostenida, intensa y no habitual. Se caracteriza por ubicarse siempre en los lugares en que el hueso sufre el máximo esfuerzo mecánico, es decir, donde se produce la mayor concentración de energía, en las llamadas "puntas de tensión". Las lesiones de peroné se suelen observar en los atletas, paracaidistas y soldados, que flexionan sus rodillas o se desplazan agazapados. La tibia, el fémur, la rótula, la pelvis, las costillas, el raquis, pueden ser asiento de lesiones de "fatiga" ósea, cada una de ellas con sus respectivos movimientos o actitudes responsables.

Tipología documental: Tesis doctorales (Doctoral)

Palabras clave: Medicina. Fatiga. Fracturas. Peroné.

Descriptores: [R Medicina > R Medicina \(General\)](#)

Unidad Académica: [Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Medicina](#)